

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi
Şarj No:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarih ve No: 21-12-1999/16461

KULLANILACAGI ZARARLI ORGANİZMALAR

| Zararlı Türü- | Uygulama alanı ve Şekli | Uygulama dozu | Uygulama aralığı |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Yaşam evresi | Kapalı alan, | 0,03 gr/m ² x 1 | 90 gün |
| Aynı hamamboceği (Bilattella germanica) | Özel tabanca | damla | |
| Nimf, ergin | | | |
| Amerikan hamamboceği (Periplaneta americana) | Kapalı alan, | 0,03 gr/m ² x 2 | 90 gün |
| Nimf, ergin | Özel tabanca | damla | |
| Oriental hamamboceği (Blattella orientalis) | Kapalı alan, | 0,03 gr/m ² x 2 | 90 gün |
| Nimf, ergin | Özel tabanca | damla | |

KULLANIM ŞEKLİ:

GOLIATH Gel hamamböceklerinin gizlendikleri, yiyecek aradıkları ve beslendikleri yerlere veya yakınlarına uygulandığında etkisi en yüksek düzeye çıkar. Bu yerler genellikle karanlık, sıcak, nemli, ayrıca buzdolaplarının arkası ve elektrik tesisatları gibi rahatsız edilmeyen yerlerdir. Bu tür yerler, öncelikle tespit edilmeli, en iyi sonuç alınabilmek için önceden temizlenmeli, diğer yiyecek kaynakları uzaklaştırılmalı ve uygulama yapılmalıdır. GOLIATH Gel kartuşları, Batı Gun® adı verilen uygulama aleti ile kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. GOLIATH Gel kartuşunu uygulama aletine takınız; maksada uygun bir uç kullanınız. Uygulama aleti üreticisinin kullanım talimatına dikkat ediniz. GOLIATH Gel buluşuk alanlara küçük damlalar şeklinde uygulanır. Jel damlaları karanlık köşelere, duvar çatlaklarına, dolap ve raf arkalarına, mutfak tezgahlarının altına, elektrik kontrol kutularına, banyo teçhizatının alt taraflarına, su ve tahliye borularına uygulanır. GOLIATH Gel'i rutin temizliklerde silinecek yerlerde uygulamayınız. Hamamböceklerinin jeli yemekten vazgeçebilecekleri göz önüne alınarak, GOLIATH Gel damlaları üzerine veya çevresine diğer insektisitlerle ilaçlama yapmayı veya GOLIATH Gel'i yeni insektisit uygulamayı yerlere koymayınız. GOLIATH Gel istenmeyen yerlere buluşursa kağıt bir havlu ile ilacı yerinden alın ve buluşuk alanı iyice temizleyiniz. Hamamböcekleri GOLIATH Gel ile bir beslenmeden birkaç saat sonra öleceklerdir. Buluşuk alanlarda ölü hamamböcekleri uygulamadan 24 saat sonra görülmür. Uygulanan alanlar 1-2 hafta sonra kontrol edilmelidir. Bcecek buluşması ciddi boyutlarda ise veya uygulanan yerin yenidiği halde hala canlı hamamböcekleri görülmüyorsa ikinci bir uygulama gerekebilir.

ÜRETİCİ FIRMA: BASF SE 67056 Ludwigshafen, ALMANYA
RUHSAT SAHİBİ: BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Mete Plaza Degirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sk. No: 84, Kat: 9-17
34752 İçerenköy-Atasehir/İstanbul
Tel : 0216 570 34 00 Fax: 0216 570 37 79

Net miktarı: 35 gr
Burdut ağırlığı:
Ambalajı açılmış ürünü son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajında muhafaza edilirse raf ömrü 2 yıldır.



Goliath® Gel

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTUSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

GOLIATH® Gel

HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI KULLANIMA
HAZIR JEL YEM

Etkili Madde : Fipronil % 0,05 afa (saf)

Kimyasal adı : 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pheno]l-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS no: 120068-37-3

Yardımcı : Butylglycol % 0,5
Maddeler : Bitrex % 0,005
:Batı Base C 1 % 100'e tamamlanır

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE,
KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇ BİR SEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ONLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ
Boş ambalaj imha şekli:

Yerel yetkililerin düzenlemelerine uygun şekilde imha ediniz veya özel atık bertaraf tesisine gönderiniz

GOLIATH® Gel BASF firmasının tescilli markasıdır.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile titreme, daha ileri durumda uyuşukluk veya çırpınma
Fipronil: Sıçanlarda akut ağızdan
LD₅₀ = 97 mg/kg

İLK YARDIM

Denye temas halinde buluşmuş giyecekleri çıkartın ve derinin buluşmuş kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayın. Göze temas halinde bol su ile 20 dakika süreyle yıkayın. Eğer yutulmuşsa hemen hekime başvurun, ambalajı veya etiketi gösterin.

ANTİDOTU VE TEDAVİ

Bilinen antidotu yoktur. Hastayı hekim denetiminde bulundurunuz.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA
GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU
TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- GOLIATH Gel kartuşlarını yüksek sıcaklıklardan uzakta, orijinal kutularında muhafaza edin.
- GOLIATH Gel'in en düşük 10 °C, en yüksek 54 °C depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

R52/53 Sıcak organizmalar için zarardır. Su ortamında uzun dönemde yan etkileri olabilir.
S12 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve kilit altında tutunuz
S28 Buluşursa cildinizi hemen sabun ve suyla yıkayınız
S36/37 Uygun koruyucu elbise ve eldiven kullanınız
S45 Kaza durumunda veya kendinizi rahatsız hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurunuz. İlaç etkiğini gösteriniz.
S60 Boşalan kapları usulüne uygun şekilde imha ediniz.
S61 Çevreye atılımını önleyiniz.



BASF TÜRK KİMYA
SAĞ. ÜRETİCİ LTD. ŞTİ.
Mete Plaza Degirmenyolu Cad.
Huzur Hoca Sk. No: 84 Kat: 9-17
34752 İçerenköy-Atasehir/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274902
Mühür No: 18846