



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

Sayı :19020089

Konu: Rodilon Mum Blok

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - THSK ÇEVRE SAĞLIĞI
DAİRE BAŞKANLIĞI - THSK ÇEVRE SAĞLIĞI
DAİRE BAŞKANLIĞI EVRAK BİRİMİ
23.12.2013 12:16 - 2013.5679.137351 / 111.01



00001096981

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
34770 Ümraniye / İSTANBUL


- İlgi: a)Genel Evrak birimine kayıtlı 25.10.2013 tarihli ve 35724 sayılı yazınız.
b)Firmanızın 06.09.2013 tarihli ve 18369 sayılı Rodilon Mum Blok 1yıl ilave stabilite hakkındaki yazınız.
c)Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi Argefar Biyosidal Ürünler Laboratuvarının 20.11.2013 tarihli ve BP 13135-USS nolu analiz raporları.

Bakanlığımızdan 25.02.1999 tarihli ve 2010/172 sayıyla Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. adına ithal izni olan Rodilon Mum Blok adlı ürüne ait raf ömrünün 3 yıla çıkarılması ve uzun süreli stabilite sonuçları hakkındaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Rodilon Mum Blok adlı ürünün uzun süreli stabilite sonuçlarına göre raf ömrünün 3 yıla çıkarılması uygun görülmemiştir.

Başkanlığımızca raf ömrü 2 yıl olarak düzenlenen ithal ruhsat belgesi ve etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:

- 1-Ruhsat Belgesi (1 sayfa)
2-Etiket Örneği (1 sayfa)



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İTHAL)

Ruhsat No	2010/172	Ruhsat Tarihi	25.02.1999
Ürünün Ticari Adı/Tipi	RODİLON MUM BLOK / 14		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Difethialone		
Aktif Madde/ler CAS numaraları	104653-34-1		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Difethialone % 0,0025 (a/a)		
Hedef canlı/canlılar	Fare, Sıçan		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Mum blok yem		
Uygulama dozu	Fare için: 15-30 gr blok yem Sıçan için: 50-100 gr blok yem		
Ambalaj miktarı/ları	330g , 7.5 kg, 25 kg.		
Antidotu	K1 vitamini		
Risk ve Güvenlik ibareleri	R20/21/22, R48/20/21/22, R52/53, S45, S53, S60, S61		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye/İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	1-LİPHATECH. INC. 3010 W. Custer Avenue Millwaukee, WI 53209 USA 2-LİPHATECH S.A.S Production Centre, Av Jean Serres, ZA Malere, 47480 Pont du Casse, FRANCE		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2014		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	19.12.2013 Yenileme (Uzun süreli stabilite uygunluğu)		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğininin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Hasan IRMAK
Kurum Başkanı a.
Başkan Yardımcısı

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası :

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
25/02/1999 – 2010 / 172

Fare ve Sıçan Mücadelesi İçin Rodentisit

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare – Ergin	Farelerin aktif olduğu, hedef dışı canlıların ulaşamayacağı şekilde 3-5 m de bir yem istasyonu içerisinde uygulanır.	İstasyon başına 15-30 gram blok yem konulur.	15 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Sıçan – Ergin	Sıçanların aktif olduğu, hedef dışı canlıların ulaşamayacağı şekilde 5-10 m de bir yem istasyonu içerisinde uygulanır.	İstasyon başına 50-100 gram blok yem konulur.	10 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.

Kullanma şekli:

Rodilon Mum blok, çocukların ve evcil hayvanların, hedef dışı yaban hayatının ulaşamayacağı yerlerde ve hasara dayanıklı blok kutuları içinde uygulanmalıdır. Fare ve sıçanların, mum blokları kolaylıkla bulup yiyebileceği alanlar belirlenir. Bu alanlar genellikle duvar kenarları, kemirilmiş alanlar, köşeler ve asma tavanlar, fare veya pisliklerinin görüldüğü yerlerdir. Mümkünse alternatif yiyecekler bu alanlardan uzaklaştırılır.

Üretici firmanın adı ve adresi;

- LiphaTech S.A.S. Production centre, Av Jean Serres, ZA Malère, 47480 Pont du Casse, France
- LiphaTECH, Inc.3010 W.Custer Avenue Millwaukee, WI 53209 USA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:53 34770 Ümraniye İstanbul

Net miktarı: 25 kg - 7,5 kg – 330 gr

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Bayer Environmental Science

Rodilon® Mum Blok

Formülasyon şekli

Mum Blok

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
Difethialone, CAS No: 104653-34-1 % 0,0025 (a/a)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Bitrex®, CAS No: 3734-33-6 % 0,001 (a/a)
İnert maddeler % 99,9965 (a/a)

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının
bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:53 Ümraniye / İstanbul
Tel : (0216) 528 66 00
Faks : (0216) 528 38 68

ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Rodilon mum blok kullanımında dikkatsizlik ve ihmâl sonucu ağızdan alındığı takdirde; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon değişiklikleri ve iç kanamalarla, bazen de ağız ve burundan kan gelmesi şeklinde zehirlenmelere neden olur.

LD₅₀ Difethialone (Akut Oral) (sıçan): 0.56 mg/Kg
LD₅₀ Rodilon Mum Blok (Akut Oral)(sıçan)>5000 mg/Kg

İlk yardım önlemleri: Zehirlenen kişi ürün etiketiyle birlikte derhal doktora götürülmelidir.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Ağır vakalarda bishidroksikumarin aşırı dozlarında olduğu gibi kas içi veya oral yolla Vit K1 tatbik edilir. Gerektiğinde uygulamaya 2 hafta kadar (protrombin zamanı kontrol edilerek) devam edilir. Ağır vakalarda kan nakli gerekebilir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Rodilon Mum blok kanın pıhtılaşmasını önleyerek iç kanamaya neden olabilir. Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız. Uygulamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız.

R20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığı
zararlıdır.

R48/20/21/22 Zararı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması
haliinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R52/53 Sudaki organizmalar için zararı, su ortamında uzun süreli
olumsuz etkilere neden olabilir.

S45 Kazı halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir
doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.)

S53 Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma
talimatını okuyun.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin.

S61 Çevreye salıvermesinden kaçının. Özel kullanım
talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

GÜVENLİK BİLGİSİ VE AÇIKLAMASI



20 Aralık 2013

20 Aralık 2013

20 Aralık 2013

20 Aralık 2013

20 Aralık 2013